PRISE EN CHARGE DE L'OBESITE EN 2025

Pr Anne Dutour, Dr Adèle Lasbleiz
CSO PACA-Ouest

Progression de l'obésité de 1997 à 2012

1997 : 3 566 000
2000 : 4 221 000
2003 : 5 388 000
2006 : 5 900 000
2009 : 6 500 000

OBEPI 2012

EN FONCTION DES REVENUS DU FOYER

En 2012 comme dans chaque étude ObÉpi depuis 1997, il existe une relation inversement proportionnelle entre niveau de revenus du foyer et prévalence de l'obésité.

Figure 30 : Répartition de la population adulte obèse par niveau de revenus mensuels du foyer depuis 1997

**25.6 %
revenu 900**

**7 %
revenu 5000**

Epidémiologie

En 2022, dans le monde, 1 personne sur 8 est atteint d'obésité dans le monde.

Données OMS, 2024

En 2024, en France : En PACA 16,8%

Evolution de la prévalence de l'obésité

Enquête OFEO, 2024

Déséquilibre chronique de la balance énergétique

Nombreux facteurs impliqués

Facteurs génétiques

Facteurs environnementaux

- > Surconsommation alimentaire
- > Sédentarité
- > Déficit sommeil
- > Microbiote intestinale
- > Facteurs périnataux
- > Polluants organiques persistants

Facteurs Epigénétiques

Map 0
Full Generic Map

Obesity System Map
Version 1.5 - 20 November 2008

L'OBESITE : Quelles conséquences ?

L'augmentation de l'IMC entraîne une augmentation de la mortalité toute cause

L'OBESITE : Quelles conséquences ?

Maladie cardiovasculaire
(Arythmie, IDM, IC) x 1,5 - 4
HTA
Dyslipidémie

Diabète de type 2 (x4-5)

AVC
HTIC
Anxiété, dépression

Asthme
SAOS
Hypoventilation alvéolaire

Infections

Maladie rénale chronique
X 2-3

Stéatose
MASH

SOPK
Troubles de la fertilité

Arthrose
Goutte

Maladies thrombo-
emboliques

Cancers

Sein, endomètre, colon-
rectum, rein

Kivimaki, Lancet Diabetes Endocrinol. 2022

Kimamki, Lancet Public Health, 2017

Madlock-Brown et al, Clin Obes, 2021

L'OBESITE : Une nouvelle classification (reco HAS 2022)

La sévérité de l'obésité ne se résume pas qu'à l'IMC

Type	IMC	Retentissement médicale	Impact qualité de vie ou fonctionnel	Troubles de la sphère psychologique	Etiologie	Comportement alimentaire	Trajectoire pondérale
1a	30-35	0	0	0 ou ayant peu d'incidence sur le cpt alimentaire	Commune	normale	Début de PEC Obésité depuis âge adulte
1b	30-35	Atteinte débutante ou bien équilibrée (HTA, DT2, SAOS,NAFLD)	Impact modéré QDV et fonctionnel	Retentissement léger (humeur, estime de soi) Ou troubles psy bien gérés (dépression traitée et suivie)	Commune	Impulsivité alimentaire sans accès de boulimie	Obésité depuis < 18 ans OU Un rebond pondéral
2	35-50	Atteinte métabo sévère Infertilité, SOPK Aggravation pathologie	Impact marqué QDV et état de santé	M. Psy sous jacentes avec net impact pondéral ou sur le comportement	Commune + F.aggravant (trauma psy, douleurs, médicaments)	Accès de boulimie épisodique	Obésité persistante OU 2 rebonds OU Echec niveau 1 OU grossesse baria
3a	35-50	Aggravation M.chronique entraînant risque majeur ou handicap	Impact mobilité avec périmètre de marche 100-500m	Psychiatriques sévères (Schizophrénie, troubles borderline, dépression sévère)	Tumeur cérébrale Pb hormonal (ex : Cushing)	Hyperphagie boulimique	Evolution poids non contrôlée Echec niveau 2

Stade de sévérité de l'obésité	Paramètres de phénotypage						
	1	2	3	4	5	6	7
	IMC	Retentissement médical	Retentissement (qualité de vie ou fonctionnel)	Troubles psychologiques, psychopathologiques et/ou cognitifs, troubles du comportement	Étiologie de l'obésité	Comportement alimentaire	Trajectoire pondérale

3a	<p>$35 \leq \text{IMC} < 50$</p> <p><i>si associé</i></p> <p>à la présence d'un des problèmes listés dans cette ligne</p>	<p>- Aggravation par l'obésité d'une maladie chronique exposant à un risque majeur ou un handicap fonctionnel (ex. : BPCO, maladies neuromusculaires, maladies inflammatoires chroniques, maladies auto-immunes, etc.)</p>	<p>- Impact du poids sur la mobilité avec périmètre de marche entre 100 et 500 m</p>	<p>- Pathologie psychiatrique sévère (ex. : dépression sévère, troubles de la personnalité borderline, paranoïaque, schizophrénie, etc.)</p>	<p>- Obésité secondaire à une dérégulation hormonale (hypercorticisme, acromégalie) ou</p> <p>- Tumeur cérébrale (dont craniopharyngiome ou autre...)</p>	<p>- Hyperphagie boulimique</p>	<p>- Évolution pondérale non contrôlée malgré un accompagnement spécialisé ou</p> <p>- Échec de prise en charge de niveau 2</p>
3b	≥ 50	<p>- Retentissement terminal des pathologies chroniques (insuffisance cardiaque, insuffisance respiratoire, insuffisance hépatique, insuffisance rénale dialysée, transplantés ou en attente de transplantation)</p>	<p>- Impact du poids sur la mobilité avec périmètre de marche < 100 m</p> <p>voire grabatisation/perte d'autonomie due à l'obésité</p> <p>ou</p> <p>- Qualité de vie fortement dégradée</p>	<p>- Troubles du spectre de l'autisme ; troubles cognitifs (retard mental, difficultés de compréhension, troubles mnésiques)</p>	<p>- Monogénique ou</p> <p>- Syndromique</p>		<p>- Échec de chirurgie bariatrique ou</p> <p>- Indication de chirurgie bariatrique avec risque opératoire élevé, âge > 65 ans et < 18 ans</p>

L'OBESITE : Quel bilan ?

Diabète

Recherche par glycémie à jeun
Puis une fois par an si pré-diabète
Ou une fois tous les 3 ans

Mesure TA par brassard
adaptée

Bilan lipidique (reco en
cours)

Bilan rénal

Par mesure du DFG et rapport
albuminurie/ Créatininurie
Une fois tous les 3 ans si normal

Explorations fonctionnelles respiratoires

IMC ≥ 30 kg/m² et dyspnée de repos ou lors
d'un effort léger

IMC ≥ 35 kg/m² et présence SAOS
IMC ≥ 40 kg/m²

Polygraphie ventilatoire (SAOS)

– IMC ≥ 30 kg/m² avec signes cliniques
évocateurs
– IMC ≥ 35 kg/m²

Gaz du sang (Syndrome obésité hypoventilation)

IMC ≥ 35 kg/m²
IMC ≥ 30 kg/m² et SpO₂ < 94 % ou
syndrome restrictif avec CPT <85%

Stéatose hépatique

Echographie abdominale ou Fatty liver index

=> Si négatif, à répéter à 3-5 ans

=> Si positif : rechercher fibrose par Fib-4

Si Fib 4 > 1,30, quantifier la fibrose par d'autres tests

Arthrose

Examen dentaire une fois
par an

Recherche de cancers

Dépistage identique à la population générale

L'OBESITE : Une prise en charge multidisciplinaire

Le but du traitement ne se réduit pas à une perte de poids à court terme mais à une amélioration des comorbidités, de l'autonomie et de la qualité de vie du patient.

Objectif : Perte de poids progressive et durable avec PEC personnalisée

PEC diététique personnalisée = Rééquilibrage alimentaire ≠ Régimes

Alimentation diversifiée, équilibrée

Travaille dans l'assiette + comportement et sensations alimentaires

Respect sensation faim/satiété

Recommandations activité physique → Activité physique adaptée

Mise en place progressive et régulière

Recommandations population générale

- 30 minutes 5 fois par semaine activité endurance d'intensité modérée

- Souplesse 2-3 fois par semaine

- Renforcement musculaire 1-2 fois par semaine

+ Lutte contre la sédentarité / temps passé assis

APA => MSS : <https://paca.sport.sante.fr/>

PEC psychologique et comportementale

**PLACE DES NOUVEAUX
TRAITEMENTS
MÉDICAMENTEUX:**

*Une révolution dans la prise
en charge ?*

GLP-1RAs have multifactorial effects

Pharmacological effects

GLP-1RA, glucagon-like peptide-1 receptor agonist

Adapted from 1. Campbell JE, DJ Drucker. *Cell Metab* 2013;17:819-37; 2. Marso SP et al. *N Engl J Med* 2016;375:311-22; 3. Ryan D, Acosta A. *Obesity* 2015;23:1119-29; 4. Hogan AE et al. *Diabetologia* 2014;57:781-4; 5. Baggio LL, Drucker DJ. *J Clin Invest* 2014;124:4223-6; 6. Bagger JJ et al. *Clin Endocrinol Metab* 2015;100:4541-52; 7. Flint A et al. *J Clin Invest* 1998;101:515-20; 8. Blundell J et al. *Diabetes Obes Metab*. 2017;19(9):1242-51; 9. Tong J, D'Alessio D. *Diabetes* 2014;63:407-9; 10. Armstrong MJ et al. *J Hepatol* 2016;64:399-408; 11. Armstrong MJ et al. *Lancet* 2016;387:679-90.

Analogue GLP1 HEBDOMADAIRE (Programme STEP)

1 injection par semaine

0,25mg → 0,5mg → 1mg → 1,7mg → 2,4mg

Body Weight Change from Baseline by Week, Observed In-Trial Data

-14,9% poids à 68S

No. at Risk

Placebo	655	649	641	619	615	603	592	571	554	549	540	577
Semaglutide	1306	1290	1281	1262	1252	1248	1232	1228	1207	1203	1190	1212

En France

A eu **Accès précoce juillet 2022-septembre 2023** pour IMC > 40kg/m² +
une complication (MCV, HTA traitée, SAOS appareillé, Dyslipidémie)

Disponible en France depuis octobre 2024 Non remboursé

HAS : Avis favorable au remboursement uniquement « chez l'adulte ayant un indice de masse corporelle (IMC) initial ≥ 35 kg/m² en cas d'échec de la prise en charge nutritionnelle bien conduite »

≠ ANSM : Prescription initiale par médecins spécialistes

≠ AMM : Adultes atteints d'obésité (IMC ≥ 30 kg/m²) ou en situation de surpoids (IMC ≥ 27 kg/m² et < 30 kg/m²) et en présence d'au moins un facteur de comorbidité lié au poids (dysglycémie, hypertension artérielle, dyslipidémie, apnée du sommeil ou maladie cardiovasculaire)

Double analogue GIP-GLP1 HEBDOMADAIRE (Programme SURMOUNT)

Injection hebdomadaire
 2,5mg → 5mg → 7,5mg → 10mg
 → 12,5mg → 15mg

-20,9% poids à 72S

Disponible en France depuis novembre 2024
Non remboursé

AMM : IMC initial $\geq 30 \text{ kg/m}^2$ (obésité) ou $\geq 27 \text{ kg/m}^2$
 + 1 comorbidité.
 En complément d'une prise en charge nutritionnelle adaptée
 ≠ HAS : Avis favorable remboursement IMC $\geq 35 \text{ kg/m}^2$

MOUNJARO PERMET UNE MEILLEURE PERTE DE POIDS QUE LE WEGOVY

SURMOUNT – 5 = 72S (en attente de publication)

-20, 2% perte poids TIRZEPATIDE 15mg

-13,7% perte de poids SEMAGLUTIDE 2,4mg

→ - 6,5% de ≠

DIMINUTION DES APPORTS ALIMENTAIRES

DIMINUTION APPETENCE POUR LES PRODUITS GRAS NON-SUCRES

DIMINUTION APPETENCE POUR ALCOOL

AUGMENTATION DE LA SATIETE

AUGMENTATION DE LA PLENITUDE GASTRIQUE

DIMINUTION DE LA FAIM

	High-fat	Low-fat
Sweet	Pancake with fruit and cream Sugar-coated doughnut Blueberry muffin Danish pastry	Grapes Muesli Fruit and yoghurt Banana
Non-sweet	Sausage sandwich English cooked breakfast Cheese and ham croissant Meat pastry	Rice crackers Bread roll Beans on toast Garden salad

Blundell et al, 2017
Quddos, Sci Report, 2023
Chuong et al, JCI Insight, 2023

QUESTIONS ?

**TOUT LE MONDE
REPOUND-T-IL ?**

**PENDANT COMBIEN DE
TEMPS PRENDRE LE
TRAITEMENT ?**

**QUELS SONT LES
AUTRES BENEFICES ?**

**L'EFFET EST-IL
DURABLE SUR LE LONG
TERME ?**

**QUELS EFFETS
INDESIRABLES A
COURT ET LONG
TERME?**

**QUELS SONT LES
AUTRES BENEFICES ?**

Effets cardiovasculaires protecteurs

- Réduction de la survenue des évènements cardiovasculaires

Effet sur les Apnées du sommeil

- Diminution du nombre d'apnées

Effets sur la glycémie : moins de diabète

A Primary Cardiovascular Composite End Point

No. at Risk

Placebo	8801	8652	8487	8326	8164	7101	5660	4015	1672
Semaglutide	8803	8695	8561	8427	8254	7229	5777	4126	1734

L'EFFET EST-IL
DURABLE SUR LE LONG
TERME ?

L'EFFET EST-IL DURABLE SUR LE LONG TERME?

Etude SELECT

RECU DE 4 ANS ET DEMI => MAINTIEN DE LA PERTE DE POIDS

Semaglutide, N	8,803	7,647	7,493	6,690	7,290	6,447	7,282	6,460	7,474	5,991	5,898	4,686	5,085	3,650	2,954	1,737	921	157
Placebo, N	8,801	7,715	7,516	6,704	7,269	6,340	7,272	6,392	7,378	5,871	5,879	4,583	5,014	3,560	2,890	1,698	898	152

**TOUT LE MONDE
REPOUND-T-IL ?**

Données patients accès précoce Wegovy, CSO : Perte de poids après traitement Wegovy

16% d'arrêt en raison d'effets secondaires et 7,5% de non répondeurs

WEGOVY®

MOUNJARO®

C In-Trial Data at Wk 68

C Participants Who Met Weight-Reduction Targets (treatment-regimen estimand)

10-15% DES PATIENTS NE REPONDENT PAS (PERTE < 5% DU POIDS)
VARIABILITE DE LA REPONSE AU TRAITEMENT

**PENDANT COMBIEN DE
TEMPS PRENDRE LE
TRAITEMENT ?**

TIRZEPATIDE

A Percent change in body weight (week 0-88)

PRISE DU TRAITEMENT PENDANT 36 SEMAINES

PUIS

→ TRAITEMENT MAINTENU

→ TRAITEMENT STOPPE

TIRZEPATIDE

A Percent change in body weight (week 0-88)

Randomisation

➔ Risque de rebond pondéral à l'arrêt du traitement

**PEUT-ON PRENDRE CE
TRAITEMENT APRES
CHIRURGIE
BARIATRIQUE ?**

PEUT-ON PRENDRE CE TRAITEMENT APRES CHIRURGIE BARIATRIQUE ?

ETUDE RETROSPECTIVE
SEMAGLUTIDE

**OUI, CE TRAITEMENT SEMBLE EFFICACE
APRES UNE REPRISE PONDERALE POST
CHIRURGIE BARIATRIQUE**

Effets indésirables sont les mêmes

**QUELS EFFETS
INDESIRABLES A
COURT ET LONG
TERME?**

QUELS EFFETS INDESIRABLES ?

	SEMAGLUTIDE %	PLACEBO %
n	2117	1262
Nausée	43,9	16,1
Diarrhée	29,7	15,9
Vomissement	24,5	6,3
Constipation	24,2	11,1

Effets indésirables surtout digestifs

Dans 99,5% léger à modéré

SURTOUT AU DEBUT

➔ ARRET DU TRAITEMENT DANS ENVIRON 7% DES CAS A CAUSE DES EFFETS INDESIRABLES

Plus de risques de lithiases biliaires

*He et al. JAMA Inter Med 2022
Widing et al, NEJM 2021
Jastreboff et al, NEJM 2022*

- *Risques de dénutrition ?
- *Risques de carences en vitamines ?
- *Risques de perte musculaire ?

NECESSITE D'ETRE PRIS EN CHARGE PAR UNE EQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE

Bilan vitaminique régulier ? +/- apports en vitamines ?

Suivi par impédancemétrie pour suivre perte masse musculaire et masse grasse

Recherche de faiblesse musculaire

Evaluer régulièrement apports alimentaires

Activité physique régulière et adaptée

Et demain ? De futurs traitements encore plus actifs!

Recommandations HAS du 8 février 2024

- **Traitement de 2^{ème} intention après échec d'une prise en charge médicale bien conduite pendant 6 à 12 mois**
- **Evaluation et prise en charge pluridisciplinaire d'au moins 6 mois**
- **Patients ayant compris et accepté la nécessité d'un suivi médical et chirurgical à long terme (à vie)**
- **Patients avec IMC >40 ou IMC 35-40 kg/m² avec au moins une comorbidité sévère**

Diabète de type 2

SAOS avec IAH > 15/h

HTA traitée

Asthme sévère (avis
pneumo ou ORL)

MASH ou fibrose

HyperTG > 5g/l résistante

SOPK
Trouble de la fertilité (Avis PMA)

HTIC

Hernie pariétale

Maladie rénale chronique après avis néphro

Incontinence urinaire résistante après avis uro

Entre 18 et 60 ans, voir 70 ans

SANS CONTRE-INDICATION

Trouble psychiatrique grave, TCA, Toxicomanie, CI anesthésique, Maladie incurable : Cirrhose Child B et C, Cancer <5 ans sauf avis onco)

Anneau - Sleeve - By pass

Gain d'espérance de vie

+ 6,1 ans tous patients opérés
+ 9,3 ans chez patients DT2

L.Syn et al (Lancet, 2021)

Perte de poids

B %TWL after LSG and LRYGB from baseline to 10 y

Etude Sleeve PASS : A 10 ans
Perte 23,4% du poids Sleeve
Perte 26,9% du poids By pass

Etude SOS Study : A 15 ans
Perte 18% du poids Sleeve
Perte 27% du poids By pass

Salminen et al, (JAMA, 2022)

L.Sjostrom et al (JIM, 2012)

Anneau - Sleeve - By pass

Amélioration des comorbidités et de la qualité de vie des patients

Comorbidités CV

Risque sarcopénie
 Risque ostéoporose
 Risque carences
 Risques psychologique

Complications métaboliques

Risque de cancer

L.Sjostrom et al (JIM, 2012)
 Wilson et al (IJMol Science, 2023)
 L Van Veldhuisen et al (Eur Heart J, 2022)
 Briscoll et al (Obésity, 2015)

- **Maladie chronique multifactorielle induite par la société sur un terrain génétique prédisposant**
- **Nécessité d'une prise en charge MULTIDISCIPLINAIRE**
- **Nouvelle ère pour les patients avec plus de choix de thérapeutiques pour les aider**
- **Vers une médecine personnalisée**
- **Nécessité d'un suivi pour l'adaptation et la personnalisation du suivi sous traitement**

1 poignée de fruits à coque sans sel ajouté

Au moins 5 fruits et légumes

(1 portion de fruit = 80-100g)
Pas plus d'1 verre de jus de fruit/jour

Au moins 2 fois par semaine des légumineuses

Ex : lentilles, pois chiches, haricots...
Les légumineuses peuvent être considérées comme des substituts aux volailles

Produits céréaliers complets ou peu raffinés tous les jours

2 fois par semaine du poisson/fruits de mer

**limiter la consommation de viande rouge et
 privilégier la volaille**

Se limiter à 500g de viande
rouge/semaine

**limiter la consommation de charcuteries,
 produits sucrés, sodas et de sel**

Se limiter à 150g de charcuterie/semaine
Privilégier le jambon blanc

**Éviter les consommation excessives de
 matières grasses ajoutées**

2 produits laitiers par jour

1 portion = 150mL de lait, 125g de yaourt, 30g de fromage

Produits céréaliers complets ou peu raffinés tous les jours

Eau à volonté !